معالجة مرض السل

سوف تبدأ بتناول مجموعة جرعات دوائية لمعالجة مرض السل لفترة تمتد من ستة إلى تسعة أشهر. (في بعض الأحيان قد تستغرق المعالجة مدة أطول).

أدوية معالجة مرض السل

إن أي دواء يمكن أن يسبب أعراضاً جانبية ويشمل ذلك أدوية معالجة مرض السل. تناول كافة الأدوية وفقاً لتعليمات طبيبك، وسوف يقوم طبيبك بمراقبة تأثير أي دواء موصوف لمعالجة حالة السل التي تعاني منها. إذا حدثت أعراض جانبية يتعين عليك إبلاغ طبيبك فوراً.

بعض الأعراض الجانبية التي يتعين أن تكون على علم بها عند تناول مجموعة جرعات دوائية لمعالجة مرض السل:

حكة مستمرة.
اضطرابات معدية أو غثيان أو فقدان الشهية.
إحساس كوخز الإبر أو تنميل أو وخز خفيف في اليدين أو القدمين.
طفح جلدي أو كدمات أو اصفرار لون الجلد.
عدم وضوح الرؤية.
بول لونه غامق.
و/أو
اصفرار العينين.

الأدوية التالية تستعمل في معالجة مرض السل ويتم تناولها كافتها على شكل حبوب.

ISONIAZID

يمكن أن يجعلك Isoniazid تشعر بالتعب، وقد يسبب الغثيان وفقدان الشهية، وفي حالات نادرة التنميل أو وخز خفيف في يديك وقدميك.

RIFAMPICIN

إن Rifampicin غالباً ما يقوم بتخفيض فعّالية حبوب منع الحمل. إن النساء اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل يحتجن الى إعلام طبيبهن قبل البدء باستعمال Rifampicin وقد تحتاجين إلى بحث أنواع أخرى من وسائل منع لحمل مع طبيبك العام أو مع عيادة تنظيم الأسرة.

إذا كان قد أجري لك زرع عدسات أو تضع عدسات لاصقة أعلم طبيبك لأن هذا الدواء غالباً ما يقوم بتبقيعها.

سوف يسبب Rifampicin تلون البول واللعاب والعرق بلون زهري ولكن لا يتعين عليك القلق إزاء ذلك.

ETHAMBUTOL أو MYAMBUTOL

على الرغم من أن العيادة التي تذهب إليها سوف تقوم بفحص بصر عينيك بشكل منتظم، يتعين عليك إعلام طبيبك على الفور إذا بدأ حدوث أية مشاكل تتعلق بالبصر. ويتعين عليك أيضاً التوقف عن تناول أدوية

معالجة مرض السل إلى أن يخبرك طبيبك بخلاف ذلك.

PYRAZINAMIDE

قد يجعلك Pyrazinamide تشعر بالغثيان ويسبب فقدان الشهية. ويستعمل هذا العقار عادة فقط في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى للمعالجة. أعلم طبيبك على الفور بأي آلام أو أوجا ع أو حمى أو طفح جلدي غير معروفة السبب.

تناول الأدوية بانتظام

من الضروري تناول كافة الأدوية وفق تعليمات الطبيب. إن تناول الأدوية بشكل غير منتظم قد يسبب ردود فعل خطيرة، ونشوء مناعة ضد العقار. تجنب شرب الكحول حيث أنه يزيد سميّة العقار والتأثيرات الجانبية.

إجراء الاختبارات أثناء المعالجة

قد يطلب منك طبيبك من وقت إلى آخر إجراء اختبارات للدم للتأكد من أن الأدوية تعالج مرض السل بفعّالية. وقد يتم إجراء اختبارات أخرى مثل فحص القشع وفحص البول للتحقق من تقدمك.

هل تريد المزيد من المعلومات؟

للمزيد من المعلومات اتصل ببرنامج مكافحة مرض السل:

TB Program
Disease Control Section
Human Services
GPO Box 1670N
Melbourne 3001

هاتف: 4115 9637 (03)

من منشورات وحدة الأمراض المعدية، قسم الصحة العامة، دائرة الخدمات البشرية.

هذه المعلومات قائمة على آخر المعلومات المتوافرة لنا بتاريخ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨.

تصميم وإنتاج وحدة اتصالات الخدمات البشرية.

هذه المعلومات متوافرة على شبكة الانترنيت على العنوان التالي:

http://hna.ffh.vic.gov.au