Lijekovi za tuberkuloznu infekciju

Developed by the
Minnesota Department of Health,
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Medicine for Tuberculosis Infection, Bosnian/Croatian/Serbian

Tuberkulozna infekcija

Va{e medicinsko osoblje je ustanovilo da bolujete od TB infekcije. Preporu~ava se da uzimate lijekove da se sprije~i razvoj tuberkuloze.

Nekada u pro{losti ste udisali TB bakcile u va{a plu}a. Va{e tijelo je sprije~avalo TB bakcile da se ne razmno`avaju ili da se ne razbolite. Bakcili u va{em tijelu nisu aktivni ali su prisutni, a da vas ne ~ine bolesnim. Vi ne mo`ete prenijeti TB bakcile na druge osobe. To se zove **TB infekcija.**

Lijekovi mogu sprije~iti razvijanje tuberkuloze

Ako ne uzimate lijekove za TB infekciju mo`ete se razboliti od tubrekuloze. Onda se TB bakcili mogu prenijeti na druge osobe. Lijekovi mogu sprije~iti razvijanje tuberkuloze, ako se uni{te TB bakcili. To se zove preventivna terapija.

Ovi lijekovi se trebaju uzeti u potpunosti kako je doktor propisao

Preventivna terapija

Kao preventivna terapija obi~no se propisuje Isoniazid (INH). **INH se mora uzimati prema preporuci medicinskog osoblja** ili ne}e biti efektivan u spre~avanju tuberkuloze.

Za vrijeme preventivne terapije morat }ete se javiti jednom mjese~no va{oj klinici da se ustanovi kako va{e tijelo reagira na lijekove.

Pojedine nuzpojave su mogu}e kao rezultat tretmana sa INH. Ako se pojave neki od navedenih simptoma odmah nazovite va{u kliniku.

- mu~nina
- povra}anje
- gubitak apetita
- umorni vi{e nego obi~no
- bol u stomaku
- tamna mokra~a
- `uta boja ko`e ili o~iju
- temperatura du`e od 3 dana
- ako ruke ili noge trnu
- osip po ko`i

Ako pijete alkohol (vino, pivo ili liker) dok se lije~ite sa INH, rizik sa nuzpojavama se pove}ava. Ako trebate dodatne informacije razgovarajte sa va{im medicinskim osobljem.