Лекарства, применяемые при лечении туберкулёза

Developed by the
Minnesota Department of Health,
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Medicine for Tuberculosis Disease, Russian

Лекарства, применяемые при лечении туберкулёза

Врач выписал Вам лекарство для уничтожения возбудителей туберкулёза в Вашем организме.

Туберкулёз излечивается с помощью лекарств, которые убивают возбудителей болезни, но эти микробы очень живучие. Вам придётся принимать лекарство многие месяцы, чтобы уничтожить все микробы. **Лекарство необходимо принимать строго по предписанию врача.**

Туберкулёз излечим

Вероятно, Вы почувствуете себя лучше уже через несколько недель, но приём лекарства необходимо продолжать до полного выздоровления.

Если Вы прекратите приём лекарства слишком рано, оставшиеся в организме микробы могут стать ещё более живучими. Может потребоваться более сильное лекарство для воздействия на эти микробы.

Необходимо принять полный курс лечения!

Лекарства от туберкулёза обычно безвредны, но иногда они могут вызывать побочные эффекты. **Если у Вас возникнут какие-нибудь из нижеперечисленных симптомов, немедленно поставьте в известность врача или медсестру:**

- потеря аппетита
- рвота
- боль в брюшной полости
- тошнота
- появление жёлтой окраски глаз или кожи
- покалывание в пальцах рук или ног
- покалывание или онемение вокруг рта
- неясное зрение или другие изменения зрения
- звон в ушах
- потеря слуха
- головокружение
- боль в суставах
- повышенная температура, которая держится дольше трёх дней
- кожная сыпь
- лёгкое возникновение кровотечений
- лёгкое возникновение синяков

Врач выписал Вам лекарства, отмеченные ниже:



_____ **Isoniazid (INH)**
(Изониазид)

_____ **Rifampin***
(Рифампин)

_____ **Pyrazinamide (PZA)**
(Пиразинамид)

_____**Ethambutol**
(Этамбутол)

_____ **Streptomycin**
(Стрептомицин; вводится инъекцией)

***** Вам необходимо знать, что рифампин может вызывать следующие побочные эффекты:

- Моча, слюна или слёзы могут приобрести оранжевую окраску.
  Если Вы носите мягкие контактные линзы, на них могут появиться пятна.

- Кожа может стать более чувствительной к солнечным лучам. Пользуйтесь кремом, защищающим от солнца, и не оставляйте открытыми никакие участки кожи.



- Противозачаточные таблетки, а также вещества, вводимые непосредственно в органы или ткани для лечения, менее эффективны, если Вы принимаете рифампин. Женщинам, принимающим рифампин, нужно пользоваться другими формами противозачаточных средств.

Поставьте в известность врача или медсестру обо всех лекарствах или народных средствах для лечения, которые Вы применяете в настоящее время.

Если Вы беременны или кормите грудью, обязательно скажите и об этом.

Лекарство для лечения туберкулёза Вы можете получить бесплатно. Ваш врач или медсестра могут заказать лекарство в Министерстве здравоохранения Миннесоты (тел. 612/676-5414).