Лечение туберкулеза

Вы начинаете проходить курс лечения туберкулеза (ТВ), который будет проходить в течение 6-9 месяцев. (Иногда курс лечения требует больше времени.)

Лекарства против туберкулеза

Все лекарства могут оказывать побочное действие, включая лекарства от туберкулеза. Принимайте все лекарства в соответствии с инструкциями, которые вам дает врач. Ваш врач будет следить за действием всех лекарств, прописанных для лечения туберкулеза. Если будут побочные действия, вы должны немедленно сообщить о них врачу.

Вот некоторые побочные действия, о которых нужно знать, проходя курс лекарственного лечения туберкулеза:

- Постоянный зуд.
- Расстройство желудка, тошнота или потеря аппетита.
- Покалывание или онемение в руках или ногах.
- Сыпь, образование синяков или пожелтение кожи.
- Расплывчатое зрение.
- Моча темного цвета и/или
- Желтый цвет глаз.

Для лечения туберкулеза применяются следующие лекарства. Все они принимаются в виде таблеток.

ISONIAZID

От таблеток "Isoniazid" у вас может быть чувство усталости, тошнота, потеря аппетита и (в редких случаях) онемение или покалывание в руках и ногах.

RIFAMPICIN

Таблетки "Rifampicin" зачастую уменьшают эффективность противозачаточных таблеток. Женщины, принимающие противозачаточные таблетки, должны сообщить об этом врачу, прежде чем начинать принимать "Rifampicin". Вам, вероятно, придется обсудить возможность применения других видов противозачаточных средств со своим врачом общей практики или в Клинике по контролю рождаемости.

Если у вас имплантированы усталики глаза, или если вы носите контактные линзы, сообщите об этом врачу, так как от этого лекарства на них могут появиться пятна.

"Rifampicin" вызовет изменение цвета мочи, слюны и пота. Они примут розоватый оттенок. Но в этом нет ничего опасного.

ETHAMBUTOL ИЛИ MYAMBUTOL

В клинике, в которую вы ходите, у вас постоянно будут проверять зрение, но если у вас произойдет нарушение зрения, вам нужно немедленно сообщить об этом врачу. Вам также

нужно будет прекратить прием лекарств от туберкулеза до тех пор, пока врач скажет вам продолжать их принимать.

PYRAZINAMIDE

Таблетки "Pyrazinamide" могут вызвать тошноту или потерю аппетита. Это лекарство, как правило, принимается в течение первых двух-трех месяцев лечения. Если у вас без видимой причины появятся боли, жар или сыпь, сообщите об этом немедленно своему врачу.

ПРИНИМАЙТЕ ЛЕКАРСТВА РЕГУЛЯРНО

Важно, чтобы все лекарства принимались в соответствии с инструкциями врача. Нерегулярный прием лекарств может вызвать серьезные реакции и развитие устойчивости к лекарствам. Старайтесь не употреблять алкоголь, т.к. он может повысить токсичность лекарств и усилить побочные действия.

АНАЛИЗЫ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ

Врач, вероятно, будет время от времени направлять вас на анализ крови, чтобы убедиться, что лечение туберкулеза с помощью лекарств проходит успешно.
Кроме того, могут потребоваться другие анализы, например, анализ мокроты или мочи, с помощью которых можно проверить, как проходит процесс выздоровления.

Более подробная информация

Если вам нужна более подробная информация, обращайтесь к работникам Отделения инфекционных заболеваний Департамента по услугам населению, занятым в Программе по борьбе с туберкулезом:

TB Program
Disease Control Centre
Department of Human Services
GPO Box 1670N
Melbourne 3001

Телефон: (03) 9637 4115

Издано Отделением инфекционных заболеваний Отдела общественного здравоохранения Департамента по услугам населению.

Эта информация основана на последних данных, имеющихся в нашем распоряжении на январь 1998 года.

Оформление и выпуск Отделения информации Департамента по услугам населению.

Данная информация имеется на системе "Интернет" по адресу:
http://hna.ffh.vic.gov.au