Medicina para la infección de tuberculosis

Developed by the
Minnesota Department of Health,
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Medicine for Tuberculosis Infection, Spanish

Infección de tuberculosis

Su doctor/s ha determinado que usted tiene infección de tuberculosis (TB). Se le recomienda tomar medicinas para prevenir el desarrollo de la enfermedad de la tuberculosis.

En algún momento en el pasado, usted aspiró gérmenes de la tuberculosis en sus pulmones. Su cuerpo mantuvo los gérmenes de la tuberculosis sin multiplicarse e hizo que no se enfermara. Los gérmenes están inactivos, pero aún se encuentran vivos en su cuerpo sin que le provoquen la enfermedad. Usted no puede contagiar los gérmenes (TB) a otras personas. A esto se lo denomina **infección de tuberculosis.**

La medicina puede prevenir el desarrollo de la enfermedad

Si no toma medicina para la infección de tuberculosis, podrá contraer la enfermedad. Esto hace que pueda contagiar los gérmenes de la tuberculosis a otras personas. Los medicamentos pueden prevenir que usted se enferme de tuberculosis matando a los gérmenes que la producen. Esta medicina se llama terapia preventiva.

Tome toda la medicina como le ha sido recetada.

Terapia preventiva

Isoniazid (INH) es la medicina que generalmente se receta como terapia preventiva. Mata los gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo. **Usted debe tomar la INH como se lo ha recetado su doctor/a** o no le será efectivo para la prevención de la enfermedad de la tuberculosis.

Su doctor/a lo querrá ver por lo menos una vez al mes durante la terapia preventiva para asegurarse que su cuerpo tolera la medicina.

La INH podría causarle algunos efectos secundarios. Llame o vea a su doctor/a inmediatamente si nota algunos de estos síntomas:

- náusea
- vómitos
- pérdida de apetito
- cansancio inusual
- dolor abdominal
- orina de color oscura
- la piel o los ojos se tornan amarillos
- fiebre durante tres o más días
- hormigueo en sus manos o pies
- erupción en la piel

El tomar bebidas alcohólicas (vino, cerveza, y licor) mientras toma la INH puede aumentar el riesgo de los efectos secundarios. Para mayor información hable con su doctor/a.