Verem Tedavisi

Verem (Tüberküloz -TB) hastalığı için altı ile dokuz ay süren bir tedavi göreceksiniz. (Tedavi süresi bazen daha uzun olabilir.)

Verem (TB) İlaçları

TB ilaçları dahil, her türlü ilaç yan etkilere yolaçabilir. Tüm ilaçları doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak alınız. Doktorunuz, hastalığınızı tedavi ederken her türlü reçeteli ilacın etkisini izleyecektir. İlaç alırken yan etkilerin ortaya çıkması halinde bunları derhal doktorunuza bildirmeniz gerekir.

Verem ilaçlarını kullanırken bilmeniz gereken yan etkilerden bazıları şunlardır:

- Geçmeyen kaşıntı.
- Mide ağrısı, mide bulantısı ya da iştah kaybı.
- El ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma ya da hafif sinirsel ağrılar.
- Deride kızarıklık, berelenme ya da sararma.
- Bulanık görme.
- İdrarın koyu renk çıkması.

ve/veya

- Göz aklarında sararma.

Verem tedavisinde aşağıda belirtilen ilaçlar kullanılmakta ve tümü tablet halinde alınmaktadır.

ISONIAZID

Isoniazid kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Ayrıca, mide bulantısı ile iştah kaybına ve ender olarak da el ve ayaklarda uyuşma ya da karıncalanmaya yolaçabilir.

RIFAMPICIN

Rifampicinin doğum kontrol haplarının etkisini azaltma olasılığı vardır. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların, Rifampicin almaya başlamadan önce bu durumu doktorlarına bildirmeleri gerekir. Aile doktorunuz ya da Aile Planlaması Kliniği ile başka bir doğum kontrol yöntemi konusunda görüşmeniz gerekebilir.

Bu ilacın lenslerde leke yapma olasılığı yüksek olduğundan, gözlerinizde lens varsa ya da kontak lens kullanıyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Rifampicin idrar, tükürük ve terin rengini değiştirerek pembeleştirecektir. Ancak, bunun için kaygılanmanıza gerek yoktur.

ETHAMBUTOL YA DA MYAMBUTOL

Devam ettiğiniz klinikte gözleriniz düzenli olarak kontrol edilecektir. Buna rağmen herhangi bir görme sorunu ortaya çıkarsa derhal doktorunuza haber vermeniz gerekir. Ayrıca, doktorunuz tersini söylemediği sürece verem (TB) ilacını almayı bırakmanız gerekecektir.

PYRAZINAMIDE

Pyrazinamide mide bulantısı ve iştah kaybına yolaçabilir. Bu ilaç genellikle sadece tedavinin ilk iki ya da üç ayında kullanılmaktadır. İlacı kullanırken ortaya çıkan nedensiz her türlü ağrı, ateş ya da kızarıklığı derhal doktorunuza bildiriniz.

İLAÇLARI DÜZENLİ OLARAK ALINIZ

Tüm ilaçların, doktorunuz tarafından verilen talimatlara uygun olarak alınması çok önemlidir. Düzensiz ilaç alımı ciddi reaksiyonlara ve ilaca karşı dirence neden olabilir. İlaç zehirlenmesini ve yan etkileri arttırabileceğinden, ilaç alırken alkollü içki kullanmaktan kaçınınız.

TEDAVİ SIRASINDA TEST YAPILMASI

İlaçların hastalığınızı etkili bir biçimde tedavi etmesini sağlamak için, doktorunuz zaman zaman kan testleri yapılmasını talep edebilir.

Ayrıca, tedavi olurken kaydettiğiniz gelişmeyi kontrol etmek için, balgam ve idrar testleri gibi başka testler de yapılabilir.

Daha Fazla Bilgiye Gereksiniminiz Var mı?

Ayrıntılı bilgi için başvurulacak yer:

TB Program
Disease Control Section
Department of Human Services
GPO Box 1670N
Melbourne 3001

Telefon (03) 9637 4115

Toplum Hizmetleri Bakanlığı, Halk Sağlığı Bölümü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından basılmıştır.

Bu bilgiler, Ocak 1998 tarihi itibariyle geçerli olan en son bilgilere dayanmaktadır.

Tasarım ve Yapım: Toplum Hizmetleri İletişim Birimi

İnternet Adresi: http://hna.ffh.vic.gov.au