Chửa trị bệnh Lao

Quí vị bắt đầu đợt thuốc chữa trị từ sáu đến chín tháng cho bệnh Lao (phổi) (TB). (Đôi khi đợt thuốc này có thể kéo dài hơn).

Thuốc trị bệnh Lao

Bất cứ loại thuốc nào cũng đều có thể gây ra phản ứng phụ, kể cả thuốc trị bệnh lao. Phải uống hết thuốc theo lời dặn của bác-sĩ cấp thuốc. Bác-sĩ của quí vị sẽ theo dõi tác dụng của bất cứ loại thuốc được cấp nào để trị bệnh lao của quí vị. Trường hợp bị các phản-ứng phụ, phải báo cho bác-sĩ của quí vị biết ngay.

Khi sử dụng một đợt thuốc trị bệnh lao, nên biết một số phản-ứng phụ dưới đây có thể xảy ra:

- ngứa dai dẳng.
- bụng khó chịu, buồn nôn hay ăn mất ngon.
- Bàn tay hoặc bàn chân bị tê, có cảm giác như bị kim châm chích hay như có kiến bò.
- Da bị vàng, có vết bầm hay nổi về đỏ.
- Mắt bị mờ.
- Nước tiểu có màu sậm. và/hay
- Tròng mắt bị vàng.

Các loại thuốc dưới đây được dùng để chữa trị bệnh lao và đều ở dạng thuốc viên.

Isoniazid

Isoniazid có thể làm cho quí vị cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và ăn mất ngon, và hiếm khi làm cho bàn tay và bàn chân bị tê hay như bị kiến bò.

Rifampicin

Rifampicin có khuynh hướng làm giảm hiệu-năng của thuốc ngừa thai. Các phụ nữ đang dùng thuốc ngừa thai nên cho bác sĩ của họ biết trước khi bắt đầu dùng Rifampicin. Quí vị có thể nên thảo luận với bác-sĩ gia-đình hay Phòng Kế-hoạch-hóa Gia-đình về các cách ngừa thai khác.

Nếu quí vị được ghép kiếng bên trong mắt hay mang kiếng dán lên tròng mắt (contact lenses), nên cho bác-sĩ biết vì loại thuốc này có khuynh hướng làm ố kiếng.

Rifampicin sẽ làm cho nước tiểu, nước bọt và mồ hôi của quí vị có màu hồng nhạt nhưng điều này không đáng quan tâm.

Ethambutol hay Myambutol

Mặc dù phòng mạch mà quí vị đến chữa bệnh thường khám mắt cho quí vị, nhưng quí vị cũng phải bảo cho bác-sĩ biết ngay khi gặp bất cứ trở ngại nào về mắt. Ngoài ra quí vị cũng phải ngưng uống thuốc trị bệnh lao cho đến khi có sự chỉ dẫn khác của bác-sĩ .

Pyrazinamide

Pyrazinamide có thể làm cho quí vị cảm thấy buồn nôn và ăn mất ngon. Loại thuốc này thường chỉ được dùng trong hai hoặc ba tháng điều trị đầu tiên. Phải báo ngay với bác-sĩ khi bị đau, nhức, sốt hay nổi về đỏ mà không có lý do.

Phải uống thuốc đều đặn

Điều quan trọng là phải uống hết đợt thuốc theo như lời dặn của bác-sĩ. Uống thuốc không đều đặn có thể gây các phản-ứng trầm trọng, cũng như khiến cho cơ-thể bị lờn thuốc. Tránh uống rượu vì rượu có thể làm cho các phản-ứng phụ nặng thêm và tăng độ độc của thuốc.

Thử nghiệm trong suốt thời gian chữa trị

Thỉnh thoảng bác-sĩ có thể cần phải thử máu của quí vị để biết chắc loại thuốc trị bệnh lao mà quí vị đang uống có công-hiệu.

Các thử-nghiệm khác, như thử đờm và nước tiểu cũng được dùng để kiểm lại sự lành bệnh của quí vị.

Muốn biết thêm chi-tiết

Muốn biết thêm chi-tiết, xin liên lạc:

TB Program
Disease Control Section
Department of Human Services
GPO Box 1670N
Melbourne 3001

Điện thoại: (03) 9637 4115

Do Ban Bệnh truyền-nhiễm, Sở Y-tế Công-cộng, Bộ Dịch-vụ Dân-sinh ấn hành.

Phiếu chỉ dẫn này căn cứ theo các chi-tiết mới nhất vào tháng Giêng 1998.

Do Ban Dịch-vụ Thông-tin Dân-sinh biên soạn và trình bày.

Phiếu này có trên Mạng lưới Thông-tin (Internet) tại địa chỉ http://hna.ffh.vic.gov.au