Thuốc để chữa trị khi bị nhiễm Bệnh Lao

Developed by the
Minnesota Department of Health
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Medicine for Tuberculosis Infection, Vietnamese

Bị nhiễm Bệnh Lao

Nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị đã xác định quý vị đang bị nhiễm Bệnh Lao (TB). Quý vị cần phải dùng thuốc để ngăn chận Bệnh Lao phát triển.

Trong quá khứ, quý vị đã hít thở vi trùng Bệnh Lao vào phổi. Cơ thể của quý vị đã ngăn chận không cho vi trùng Bệnh Lao phát triển hoặc làm cho quý vị đau ốm. Vi trùng Lao tuy bất động nhưng vẫn còn sống trong cơ thể mà không gây đau ốm cho quý vị. Quý vị không thể lây vi trùng Bệnh Lao cho những người khác. Sự kiện này được gọi là **bị nhiễm Bệnh Lao.**

Thuốc có thể giúp quý vị ngăn chận sự phát triển của Bệnh Lao

Nếu quý vị không dùng thuốc chữa trị khi bị nhiễm Bệnh Lao, quý vị có thể bị Bệnh Lao. Sau đó vi trùng Bệnh Lao có thể lây sang những người khác. Thuốc có thể giúp quý vị ngăn chận vi trùng Bệnh Lao phát triển bằng cách tiêu diệt các vi trùng này. Thuốc này được gọi là thuốc ngừa Bệnh Lao.

Quý vị phải dùng tất cả thuốc đúng theo lời chỉ dẫn

Phương thức ngăn ngừa Bệnh Lao

Isoniazid (INH) là một loại thuốc thường được dùng như một phươi thức ngăn ngừa Bệnh Lao. Thuốc này tiêu diệt vi trùng Lao trong cơ thể của quý vị. **Thuốc INH phải được dùng đúng theo lời chỉ dẫn của nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị**, nếu không thì nó không có hiệu lực để ngăn chận Bệnh Lao.

Nơi cung cấp dịch vụ y tể của quý vị muốn được gặp quý vị ít nhất mỗi tháng một lần trong thời gian xử dụng phương thức ngăn ngừa Bệnh Lao thì mới đãm bảo cơ thể quý vị chịu đựng được thuốc.

Quý vị có thể bị một vài phản ứng phụ khi dùng thuốc INH. Quý vị nên lập tức gọi điện thoại đến nơi cung cấp dịch vụ y tế nếu có những triệu chứng sau đây:

- buồn nôn
- ói mửa
- ăn mất ngon
- mệt mỏi một cách khác thường
- đau bụng
- nước tiểu có màu vàng sậm
- da hoặc mắt trở nên vàng
- sốt ba ngày hoặc lâu hơn
- cảm thấy tê tê ở tay hoặc chân
- phát ban ở da (skin rash)

Nếu trong thời gian dùng thuốc INH, quý vị uống các loại nước uống có chất cồn (rượu vang, bia, rượu mạnh), quý vị có thể làm tăng thêm nguy cơ của những phản ứng phụ. Xin hỏi nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị để biết thêm chi tiết.