Thuốc để chữa trị Bệnh Lao

Developed by the
Minnesota Department of Health
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Medicine for Tuberculosis Disease, Vietnamese

Thuốc để chữa trị Bệnh Lao

Nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị đã kê toa thuốc để tiêu diệt vi trùng Lao (TB) trong cơ thể của quý vị.

Bệnh Lao có thể chữa trị bằng cách uống thuốc để tiêu diệt vi trùng Lao, nhưng vi trùng Lao rất mạnh. Quý vị cần phải dùng thuốc chữa trị trong nhiều tháng mới chắc chắn là tất cả các vi trùng đã bị tiêu diệt. **Quý vị cần phải dùng thuốc đúng theo lời chỉ dẫn của nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.**

Bệnh Lao có thể chữa trị được

Mặt dù quý vị có thể cảm thấy khoẻ hơn trước trong vài tuần lễ đầu, nhưng quý vị vẫn phải tiếp tục dùng thuốc thì mới chữa hẳn bệnh.

Nếu quý vị ngưng dùng thuốc quá sớm, vi trùng Lao còn sống trong cơ thể có thể trở thành mạnh hơn. Chừng đó quý vị cần phải dùng thuốc mạnh hơn thì mới tiêu diệt được vi trùng này.

Quý vị phải dùng tất cả thuốc

Các loại thuốc chữa trị Bệnh Lao thường rất an toàn, nhưng đôi khi thuốc cũng gây ra những phản ứng phụ. **Nếu quý vị bị một trong những triệu chứng sau đây, thì nên lập tức gọi điện thoại hoặc tới nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị:**

- ăn mất ngon
- ói mửa
- đau bụng
- buồn nôn
- mắt hoặc da của quý vị trở nên vàng
- các ngón tay hoặc ngón chân của quý vị bị tê tê
- vòng quanh miệng của quý vị cũng bị tê tê hoặc bị tê dại
- thị giác của quý vị thay đổi hoặc bị mờ
- lỗ tai của quý vị bị lùng bùng
- mất thính giác
- choáng váng
- đau nhức khớp xương
- bị sốt hơn ba ngày
- phát ban ở da (skin rash)
- dễ bị chảy máu
- dễ bị bầm tím

Nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị đã cho toa các loại thuốc được đánh dấu dưới đây:

_____ **Isoniazid (INH)**

_____ **Rifampin***

_____ **Pyrazinamide (PZA)**

_____ **Ethambutol**

_____ **Streptomycin** (streptomycin là loại thuốc chích)



* Quý vị cũng cần nên biết những phản ứng phụ của loại thuốc rifampin:

- Nước tiểu, nước miếng hoặc nước mắt có thể đổ thành màu vàng cam. Loại kiến mềm đeo sát tròng mắt (contact lenses) có thể bị biến màu.

- Da của quý vị có thể nhạy cảm với ánh nắng. Quý vị nên dùng kem thoa che nắng và che kín da khi ra nắng.



- Thuốc ngừa thai và các vật cấy sẽ bị giảm hiệu lực khi quý vị dùng thuốc rifampin. Phụ nữ nào đang dùng thuốc rifampin thì nên dùng phương thức ngừa thai khác.

Quý vị nên báo cho nơi cung cấp dịch vụ y tế biết về những loại thuốc hoặc những phương thức mà quý vị đang dùng.

Quý vị nên báo cho nơi cung cấp dịch vụ y tế biết nếu quý vị đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Quý vị có thể được cấp thuốc trị Bệnh Lao miễn phí. Nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị có thể liên lạc với Bộ Y Tế của tiểu bang Minnesota để xin cấp thuốc cho quý vị, số điện thoại của Bộ Y Tế là (612/ 623-5414).